

doit, en vertu de la loi de priorité, porter le nom de *Phrygocephalus scutellatus* Oliv., au lieu de *Phryg. Olivieri* D. B.

Il y a plus de vingt ans que j'ai reconnu l'erreur commise par les auteurs de l'*Erpétologie générale*, et si je ne l'ai pas relevée plus tôt, c'est que l'occasion de le faire ne s'est jamais présentée.

---

MISSION GÉODÉSIQUE DE L'ÉQUATEUR. COLLECTIONS RECUEILLIES

PAR M. LE D<sup>r</sup> RIVET,

**Coléoptères : Cérambycides .**

PAR M. E. GOUNELLE.

***Heterachthes myrrheus* nov. sp.**

Omnino fulvo-castaneus, supra subopacus, fere glaber. subtus nitidus. sublaevis. subtilissime sparsim pubescens; caput subtiliter punctato-coriaceum, inter antennas sulcatum, valdeque concavum, tuberibus antenniferis intus cornutis; antennæ in utroque sexu corpore longiores, haud sulcatae, infra setis nonnullis ciliatae, scapo brevi, clavato, dense subtiliter punctulato, art. 3-6 ♂ paulo incrassatis; thorax latitudine sesqui longior, subcylindricus, antice posticeque perparum coartatus, punctis rugulisque undulatis leniter inordinatim dilaceratus, dorso obsolete quadrinodosus, tuberculo oblongo in medio carinulaque brevi propter suturam instructus; scutellum parvum, semirotundum; elytra leviter haud crebre punctata, punctis nonnullis majoribus, setigeris. ordinatis. longitudinaliter propter suturam utrinque paulo depressa, apice obliquiter singulatim valde lunata et extus longe spinosa, angulis suturalibus dentatis: femora clavata, incrimia, postica elytrorum extremitatem haud attingentia; tibiæ mediae et posticae extus haud sulcatae. — Long. 7-7.5 millim.

Lojá, Équateur 1903. — 4 ex. ♂, ♀.

***Mecometopus accentifer* nov. sp.**

Fuscus, griseo-pubescens, fronte flavo-bivittata, antennis pedibusque rufis, elytris castaneis, vittulis tribus linearibus, communibus, albidis, accentum circumflexum singulatim simulantibus ornatis, basi etiam anguste albida, clava femorum in medio interdum infuscata: caput subtomento parum distincte punctulatum, rostro perparum elongato, genis oculis haud longioribus; antennæ dimidio corporis multo breviores, postice incrassatae, basi setis nonnullis hirtae; thorax globosus, lateraliter et subtus pilis griseis elongatis hirsutus, dorso in cristam verrucosam ♀, obsolete ♂ acutius longitudinaliter prominens; scutellum semi-ovale, albido-tomentosum: elytra thorace paulo latiora, apice truncata, angulis

externis ♂ obtusis, ♀ brevissime productis, creberrime subtiliter punctulata: femora gradatim clavata, postica elytrorum apicem ♀ haud ♂ perparum superantia, breviter bidentata: tibiae posticae rectae, sublineares; tarsorum posticorum art. 1 ceteris simul sumptis paululum longior; corpus subtus pilis griseis decumbentibus indutum. — Long., 7,9-8,4 millim.

Terme Sud (alt., 2,8/10 m.), Équateur 1903. — 3 ex. ♂, ♀.

**Mecometopus Riveti** nov. sp.

Niger, elytris sulfureis, brunneo-vittatis et maculatis, antennarum art. 5-11 tarsisque testaceis: caput punctatum, pube rara grisea indutum, rostro parum elongato, genis oculis paululum longioribus: antennae thorace duplo longiores, postice gradatim incrassatae, setis nonnullis sparsim hirtae: thorax subglobosus, latitudine haud longior, punctis scabris minutissimis dense cribratus, dorso longitudinaliter obsolete gibbosus — gibba granis subordinatis asperata — pubeque grisea in disco aream magnam denudatam includente leviter obsilus; scutellum triangulare, grisco-pubescens: elytra thorace haud latiora, angusta, parallela, apice truncata, angulis externis breviter spinosis, vittis duabus brunneis, elongatissimis. 1<sup>a</sup> subsuturali, perparum obliquiter arcuata, infra scutellum incipiente, postice sensim dilatata et ad quartam partem posteriorem proxime marginem externam terminata, 2<sup>a</sup> submarginali, infra humerum incipiente, basi cuneata, postice lineari et usque ad apicem continuata nec non macula magna subapicali etiam brunnea, nec suturam nec marginem posticam attingente singulatim ornata; femora media breviter dentata, postica mediocriter sensim incrassata, elytrorum apicem paulo superantia, breviter hispinosa; tibiae posticae perparum flexuosae; tarsorum posticorum art. 1 ceteris simul sumptis sesqui longior: corpus subtus subtiliter grisco-pubescens. — Long., 11 millim.

Santo Domingo de Los Colorados (alt., 510 m.), Équateur 1905. — 1 ex.

Par les taches de ses élytres disposées en bandes longitudinales, cette espèce présente un système de coloration tout à fait exceptionnel chez les *Mecometopus* <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *M. Riveti* se trouve aussi en Colombie; toutefois les exemplaires provenant de ce pays diffèrent quelque peu du type. Les différences paraissant constantes, cette variété mérite d'être signalée et décrite :

**MECOMETOPUS RIVETI** var. **PILOSA** nov. var.

Antennarum art. 2-11 testaceis, elytrorum vitta subsuturali brunnea a basi ad medium lineari deinde abrupte obliquiter extus dilatata, macula apicali antice recte truncata, corpore subtus pilis longioribus densius obsito abdominisque segmentis basi anguste denudatis a typo discedit.

Rio Dagua : 3 ex. Collect. Deutsches Entomologisches National Museum et Gounelle.

**Trachyderes Bonplandi** nov. sp.

Niger. capite, scapo, thorace pedibusque pro parte obscure rubris, elytris laete castaneo-rufis. antennarum art. 3-6 basi luteo-fulvis, art. 10 (interdum) et 11 testaceis; caput scabroso-punctatum, inter antennis sulcatum, fere glabrum, tuberculis antenniferis intus porrectis, occipite excavato, longitudinaliter carinato, fronte depressa, genis acute productis; antennae ♀ corpore haud longiores, scapo clavato, sparsim punctato, art. 3-10 paulo depressis, apice lateraliter intus angulatis sulcoque longitudinali carinula acuta bipartito singulatim impressis, art. 3 subdilatato; thorax transversus, supra punctis grossis piliferis sparsim notatus, depressionibusque duabus transversis carina elevata paulo arcuata separatis excavatus, lateraliter utrinque propter marginem anticam tuberosus denteque validissimo, falcato, retrorsum spectante, tuberculo magno antice instructo armatus, basi et subtus dense flavo-villosus; scutellum magnum, triangulare, cuneatum, grosse sparsim punctatum; elytra latitudine duplo laetora, glabra, rugulis vermiculatis postice sensim obsolescentibus, sparsim subtilissime punctulatis leviter exsculpta, apice conjunctim rotundata; prosternum sulco debili transversim aratum, sulci margine antico carinato et in medio retrorsum angulato, glabro; prosterni processus postice inter coxas longe projectus, antice leniter declivis, haud truncatus; mesosterni processus tumidus, antice obtuse tuberculatus; sterna femoraque infra dense, abdomen subtiliter flavo-villosa. — Long., 23-26 millim.

Pinullar (alt. 2,900 m.), Équateur 1903. — 3 ex. ♀.

**Cleodoxus lineaticollis** nov. sp.

Brunneo-ferrugineus, pube flavo-grisea dense vestitus; caput sub pube haud distincte punctatum, inter antennis concavum, fronte subquadrata, paululum tumida, oculis valde emarginatis, minute granulatis, lobis inferioribus subquadratis genisque paulo brevioribus; antennae corpore sesqui breviores, subtus setis nonnullis laxissime ciliatae, scapo elongato, basim thoracis fere attingente, subfusiformi, art. 2-11 ferrugineis, filiformibus, art. 3 sequente paulo longiore; thorax transversus, basi recte truncatus punctisque aliquibus transversim dispositis notatus, margine antico perparum arcuato, supra subinaequalis, vittisque quatuor angustis, integris, nigro pubescentibus, duabus mediis, depressis, antice sensim convergentibus, gibbam debilem oblongam includentibus, duabus externis, parallelis, longitudinaliter ornatus, lateraliter tuberculo valido, obconico, apice uncinato in medio utrinque armatus, posticeque infra tuberculum arcuatim coartatus et nigro-maculatus; scutellum triangulare, apice recte truncatum lateraliter nigro-marginatum; elytra basi thorace laetiora, postice sensim attenuata, convexiuscula, utrinque a basi fere ad apicem acute carinata, lateraliter abrupte declivia, apice singulatim obliquiter lunata, angulis

externis valde spinosis, suturalibus brevissime dentato-productis, basi bigibbosa — gibbis validis cristaque magna pilorum nigrorum instructis — postice obtuse bicostata — costis latis, debilibus, antice et postice nigro-maculatis, a medio incipientibus et longe ante apicem terminatis — punctis postice remotioribus haud dense cribrata guttisque nigricantibus precipue super carinas et propter margines laterales ordinatim dispositis huc et passim ornata; coxæ anticae rotundatae, extus haud angulatae, prosterni processu triangulari vix separatae; mesosterni processus paululum latior, inter coxas attenuatus, antice vix declivis, postice recte truncatus; acetabula media extus subelasa; femora crassa, valde clavata, media et postica subæqualia, apice infuscata, postica abdominis extremitatem haud superantia; tibiæ basi et apice nigricantes, mediæ extus sulcatae; tarsi postici elongati, art. 1 cæteris simul sumptis æquali, basi testaceo; metasternum sparsim punctulatum; abdominis segmentum ultimum elongatum, triangulare, apice lunatum et extus utrinque dentatum. — Long., 8 millim.: lat. hum., 3 millim.

Tulcan, Équateur 1901. — 1 ex. (♂?).

**Hebestola macilenta** nov. sp.

Gracilis, brunneo-ferruginea, labro. antennarum art. 3-11 basi tarsisque flavis vel flavo-rufis, pilis sordide griseis haud dense vestita; caput inter antenas valde concavum, crebre punctatum, fronte trapezoidali, fere plana, tuberibus antenniferis magnis, elevatis, oculorum lobis inferioribus subelongatis, genis brevibus; antennæ ♂ corpore plus sesqui longiores, ♀ elytrorum apicem paulo superantes, subtus ciliatæ, scapo gradatim leniter clavato, fossulis setigeris sparsim notato, art. 4 præcedente nec non et sequente longiore; thorax latitudine paululum longior, cylindricus, lateraliter ante medium spina parva paulo erecta utrinque armatus, crebre punctatus, supra linea tenui griseo-pubescente longitudinaliter bipartitus; scutellum semi-ovale, in medio glabrum et depressum; elytra elongata, postice sensim subattenuata, apice obliquiter breviterque subtruncata, angulis suturalibus rotundatis, externis brevissime productis, dorso deplanaata, punctis magnis denudatis postice obsolescentibus irregulariter cribrata setisque brevibus ordinatis parce hirsuta; coxæ anticae globosæ, processu prosternali angusto perparum separatae; mesosterni processus paulo latior, concavus, postice obtusus; acetabula media extus clausa; femora brevina, gradatim leniter clavata, postica abdomine multo breviora; tibiæ mediæ extus sulcatae; tarsi appendiculati; tarsorum posticorum art. 1, 2° et 3° simul sumptis æqualis; abdominis segmentum ultimum ♂ apice rotundatum ♀ apice perparum incisum depressioneque semi-rotunda notatum. — Long., 9-9,5 millim.

Lojá, Équateur 1903. — 2 ex. ♂, ♀.

*Hebestola candicans* nov. sp.

Gracilis, rufo-ferruginea, antennis pedibusque ditioribus, pube albida haud dense vestita; caput inter antennis concavum, subtiliter punctulatum, tuberculis antenniferis magnis, elevatis, fronte trapezoidali, oculorum lobis inferioribus subelongatis, genis brevibus: antennae ♀ corpore vix longiores, subtus laxe ciliatae, scapo gradatim leniter clavato, fossulis haud notato, art. 4 praecedente nec non et sequente multo longiore; thorax latitudine haud longior, subcylindricus, lateraliter ante medium spina parva paulo erecta utrinque armatus, subtiliter crebre punctatus; scutellum semi-rotundum, dense albido-pubescentis; elytra elongata, parallela, apice obliquiter breviterque subtruncata, angulis suturalibus rotundatis, externis brevissime productis, dorso paulo deplanata, punctis postice obsolescentibus irregulariter haud dense cribrata setisque brevibus, albidis, ordinatis, sparsim hirsuta; coxae anticae globosae, processu prosternali angusto perparum separatae; mesosterni processus paulo latior, emcatus, postice obtusus; acetabula media extus clausa; femora brevia, gradatim leniter clavata, postica abdomine multo breviora; tibiae mediae extus obsolete sulcatae; tarsi appendiculati: tarsorum posticorum art. 1, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> simul sumptis aequalis; corpus subtus punctis dispersis impressum; abdominis segmentum ultimum ♀ apice submarginatum, depressioneque semi-rotunda notatum. — Long. 8.7 millim.

Pinullar (alt., 2,900 m.), Équateur 1903. — 1 ex. ♀.

COLÉOPTÈRES : PÉDILIDES ET ANTHICIDES REcueillis AU JAPON,

PAR MM. J. HARMAND ET E. GALLOIS [Col.],

PAR M. MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les chasses faites par MM. E. Gallois et J. Harmand et envoyées au Laboratoire d'Entomologie du Muséum, bien qu'elles ne nous offrent qu'une espèce nouvelle, comprennent un certain nombre d'anciennes espèces plus ou moins rares, notamment des *Anticomorphus* Lewis, et par cela offrent beaucoup d'intérêt. Voici l'énumération de ces récoltes entomologiques :

*EURYGENIUS NIPONICUS* Lewis. Environs de Tokio (J. Harmand); Kiou Siou ou Kiushiu (E. Gallois).

*STEREOPALPUS GIGAS* Marseul. Tamura près Hiratsuka (E. Gallois).

*MACRATRIA FLUVIATILIS* Lewis. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

*MACRATRIA JAPONICA* Harold. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).